

# Geïrriteerd kind

## Geïrriteerd kind

Een geïrriteerd kind is vaak een reden tot consultatie op de spoedgevallendienst.

Het komt frequenter voor bij jonge ouders en bij een eerste kind.

Vaak is het voor de ouders moeilijk om in te schatten wat de oorzaak van de irritatie is. Dit creëert onzekerheid en angst.

Een systematische ondervraging van de ouders over het eet-, slaap- en huilgedrag, gecombineerd met een grondig klinisch onderzoek is vaak voldoende om de oorzaak te achterhalen.

Het kennen van de meest voorkomende mechanismen is een grote hulp voor de spoedarts.

## 1. Kliniek

Volgende punten zijn belangrijk in de klinische evaluatie:

### GEDRAG

Graad van irritabiliteit  
Lethargisch  
bewustzijnsverandering

### VITALE TEKENS

Koorts  
Oximetrie  
Pols  
Ademhalingsfrequentie  
Bloeddruk

### DE HUID

Cyanose: Wijst op hypoxie  
Purpura  
Petechiën  
Rash

### VOEDINGS-EN STOELGANGSPATROON

Diarree  
Braken  
Constipatie

### TOXIDROOM

## Aard vh huilgedrag

Vraag de volgende zaken systematisch na:

### START VAN HET HUILEN

Plotseling  
Sporadisch  
Progressief

### DUUR

### INTENSITEIT

### TYPE HUILGEDRAG

Schreeuwen  
Kreunen  
Zeuren  
Zeer intens

### FACTOREN DIE HET HUILEN ERGER MAKEN

Tijdens defecatie  
Tijdens ophouden van stoelgang  
Tijdens het voeden

## Mechanismen

ELK KIND HEEFT DAGELIJKS IRRITATIEPERIODE(N)

Meestal is dit 's avonds

OP DE LEEFTIJD VAN ZES WEKEN HUILEN ZE NOG DAGELIJKS

Een uur lang

tot 4 uren per dag

IRRITATIE KAN MEN ZIEN DOORDAT HET (HUIL)GEDRAG ANDERS IS DAN ANDERS

DE MEEST FREQUENTE OORZAAK IS KOLIEKPIJNEN

Komt voor bij 25% van de gezonde kinderen

De periode ervoor kenmerkt zich door:

optrekken van de knieën

maken van stoelgang

De leeftijd waarop de kolieken het meest frequent voorkomen is

vanaf 2 tot 3 weken oud

het duurt ongeveer 12 weken lang

Koliekpijnen zijn de exclusiediagnose

## 2. Oorzaken

**DE MEEST FREQUENTE OORZAKEN BIJ  
EEN CONSULTATIE VAN EEN ARTS VOOR  
EEN GEIRRITEERD KIND ZIJN:**

- Koliekpijnen
- Angst van de ouders
- Doorbreken van de tanden
- Constipatie
- Luierirritatie

**INFECTIES ALS REDEN VOOR IRRITATIE**

○ MINEURE ACUTE INFECTIES

- Bovenste luchtweginfectie
- Otitis Media

- Thrush
- Gingivostomatitis

- URINEWEGINFECTIE
- MENINGITIS
- OSTEOMYELITIS
- PNEUMONIE
- GASTRO-ENTERITIS

#### **GASTRO-INTESTINALE OORZAKEN VAN IRRITATIE**

- REFLUX (OESOFAGITIS)
- EEN INGEKLEMDE BREUK
- INTUSSEPTIE
- EEN ANALE FISSUUR

#### **TRAUMATISCHE OORZAKEN VAN IRRITATIE**

- VREEMD LICHAAM INGESLIKT OF GEINHALEERD
- FRACTUUR
- AFKNELLEN VAN EEN VINGER OF VAN DE PENIS

Meestal door haar dat errond is gedraaid

- EEN INTRACRANIEEL HEMATOOM

Subduraal

Epiduraal

- OOGLETSEL MET CORNEALE ABRASIE
- KINDERMISHANDELING
- EEN SPLINTER

#### **MEDICATIE ALS OORZAAK VAN IRRITATIE**

- VACCINATIEREACTIE
- NIEUWE MEDICATIE
- THUISREMEDIES
- VITAMINEGEBRUIK (risico op overdosering)

#### **DEFICIENTIE ALS OORZAAK VAN IRRITATIE**

- ONDERVOEDING
- YZERTEKORT (anemie)

#### **CARDIOPULMONALE OORZAKEN VAN IRRITATIE**

- SUPRAVENTRICULAIRE TACHYCARDIE
- CONGESTIEF HARTFALEN

- HYPOXIE

## TORSIO TESTIS

## ENDOCRIEN / METABOOL

- Bijvoorbeeld hypoglycemie

## VASCULAIRE OORZAKEN

## SIKKELCEL CRISIS

### 3. Diagnose workup

#### ANAMNESE

- Voedingspatroon
- Huilpatroon
- Slaappatroon
- Geboorte vlot? stuitligging? prematuriteit?

#### KLINISCH ONDERZOEK

- Volledig ontkleden van het kind is belangrijk
- Tekens van dehydratatie aanwezig?
  - Verlengde capillaire refill > 2 seconden
  - Droge mucosa
- Kolieken?
- Angstige ouders?
- Doorbreken van de tanden?
- Constipatie?
- Luierirritatie?

#### LABORATORIUMTESTEN

- Veneuse bloedname
  - complet (CBC)
  - Chemie
- Urine
- Bloedglucose vingerprik
- Culturen op indicatie (bloed, urine, stoelgang)

#### TECHNISCHE ONDERZOEKEN

- Op indicatie
- RX thorax, ledematen
- ECG
- Stoelgangsstaal testen op bloed
- Radiografie met bariumpap
- Oogonderzoek met fluorescine

### 4. Behandeling

#### EERSTE OPVANG

- ABC: vrije luchtweg, ademhaling, circulatie
- Onmiddellijk verlossen van haartourniquet of splinter

## OP SPOEDDIENST

Bij Kolieken

Kalmerende activiteiten (stressreductie)

Geen stimulerende middelen (Cola, Koffie)

Beperk slapen overdag

## OPNAMEKRITERIA BIJ EEN GEIRRITEERD KIND

Een mogelijke levensgevaarlijke onderliggende oorzaak

Duidelijke stress bij de ouders door het kind

## Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

---

**Bron-URL:** <https://medicsformedics.nl/nl/ge%C3%AFrriteerd-kind>

### Links

[1] <https://medicsformedics.nl/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://medicsformedics.nl/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>