

# Pre-eclampsie

## Ernstige preeclampsie

- ontstaat vanaf 20 weken zwangerschap
- BDS  $\geq$  160 of BDD  $\geq$  110 mmHg
- proteinurie
- oedemen
- oligurie
- orgaandysfunctie
- hoofdpijn
- IUGR

Eclampsie = preeclampsie met gegeneraliseerde stuipaanvallen

## Behandeling bij pre-eclampsie?

- ziekenhuisopname
- zuurstoftoediening
- profylaxe van stuipen: magnesiumsulfaat (IV of IM)
- bloeddrukcontrole
  - doel = BDD 90-100 mmHg
- hydralazine
- labetalol
  - voorkom te plotse bloeddrukdaling
- maternale monitoring
  - Ademfrequentie
  - reflexen
  - urinaire output
  - bewustzijn
- fetale monitoring
- dringend verloskundig advies en vooral een dringende bevalling

## CASUSOMSCHRIJVING ERNSTIGE PREECLAMPISIE

vrouw, 25j  
34 weken zwanger  
BD 180/110 mmHg  
SpO<sub>2</sub> 90% bij omgevingslucht  
ernstige dyspnee  
longoedeem op thoraxfoto  
reeds 2 uren anurie  
proteinurie ++++  
Hb 11 g/dL  
plaatjes 170 000/mm<sup>3</sup>  
normale leverfuncties

## Voeg een nieuwe reactie toe

[Login](#) [1] of [registreer](#) [2] om te kunnen reageren

---

**Bron-URL:** <https://www.medicsformedics.be/nl/pre-eclampsie>

### Links

[1] <https://www.medicsformedics.be/nl/user/login?destination=node/%23comment-form>

[2] <https://www.medicsformedics.be/nl/user/register?destination=node/%23comment-form>